

## **ANÁLISIS DE SANGRE PARA DETERMINACIÓN DE ANTIGENO PROSTÁTICO ESPECÍFICO - PSA**

### **INSTRUCCIONES:**

- *No mantenga relaciones sexuales 48 horas antes de realizar el análisis.*
- *No ande en bicicleta ni realice ejercicios físicos 48 horas antes del análisis.*
- *Concurra al Laboratorio, manteniendo un período de **ayuno de 8 a 14 horas**.  
Cene de manera habitual y **cuente** las horas de ayuno a partir de finalizada la  
cena.*
- *No supere las 14 horas de ayuno.*
- *No fume, ni beba café, té o mate durante el período del ayuno.*
- *Si lo desea puede beber agua.*
- *Informe al Laboratorio el nombre de los medicamentos que recibe o ha recibido  
últimamente.*

**Nota (1):** si se ha realizado un **tacto rectal** espere 1 semana para realizarse el  
análisis

**Nota (2):** si se ha realizado una **biopsia rectal**, una **cirugía de próstata** o  
ha  
padecido una infección urinaria, **espere de 3 a 6 semanas** antes  
de realizarse el análisis

**Por favor, cumpla con estas instrucciones. LA CALIDAD es nuestro objetivo.**